







Тип документа	АЛГОРИТМ					Страница 1 из 4
Назначение	Медицинский персонал Представительств ТОО «B.V.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.12	Редакция	001	
Название	ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИЯМИ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ					
Разработано	Главная медицинская сестра		Кондратьева О.О.			
Согласовано	Медицинский директор		Аубакиров М.Е.			
Подписано	Генеральный директор		Эргезер М.Ф.			
Утверждено	Приказом Генерального директора ТОО «B.V.NURA» № 17 от 17.04.2017 г.					
К внедрению с	24.04.2017 г.					

**Цель:**

- Снизить риск профессионального заражения гемоконтактными инфекциями от известных и потенциальных источников инфекции.

№	Положения
1.	Весь врачебный, средний и младший медицинский персонал ТОО «B.V.NURA», при отсутствии медицинских противопоказаний, должен быть привит против гепатита В.
2.	<p><b>Риск заражения медицинских работников инфекциями с парентеральным путем передачи существует при:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Контакте с большим количеством крови – [код А5.1 в отчетности по инцидентам],</li> <li>При загрязнении кожи (если имеются повреждения) и слизистых биологическими жидкостями пациента с гемоконтактной инфекцией (кровь, сыворотка, ликвор, спинномозговая жидкость, сперма и др.) – [код А5.1 в отчетности по инцидентам],</li> <li>Во время выполнения медицинских манипуляций, когда возникает аварийная ситуация (попадание крови в открытую рану при порезе, укол использованной иглой (видимая кровь на игле), повреждение мелкими обломками кости и др.) – [код А5.2 в отчетности по инцидентам].</li> </ul> <p>В соответствии с действующими нормативными документами, вышеперечисленные ситуации расцениваются как <b>аварийная ситуация</b>.</p>
3.	Профилактику профессионального заражения обеспечивает строгое соблюдение санитарно-гигиенического, противоэпидемического и дезинфекционного режимов работы в Центре.
4.	<b>Алгоритм действий медицинских работников:</b>
4.1.	<p>Оказать само- или взаимопомощь (для оказания само- и взаимопомощи воспользуйтесь «Аптечкой для оказания первой помощи» (см. Алгоритм М-К3/1):</p> <p>а) При попадании биологической жидкости на <b>слизистую глаз</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обильно промыть водой. Не тереть!</li> </ul> <p>Используется вода водопроводная вода из системы центрального водоснабжения.</p> <p>б) При попадании биологической жидкости на <b>слизистую носа</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обильно промыть водой оба носовых хода. Не тереть!</li> </ul> <p>Используется вода водопроводная вода из системы центрального водоснабжения.</p> <p>в) При попадании биологической жидкости на <b>слизистую рта, горла</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обильно промыть слизистую водой,</li> <li>прополоскать 70% этиловым спиртом.</li> </ul> <p>г) При попадании крови или биологической жидкости на <b>неповрежденную кожу</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>обработать кожу 70% этиловым спиртом или спиртосодержащим антисептиком с соблюдением экспозиции,</li> <li>обмыть водой с мылом,</li> <li>насухо вытереть одноразовым бумажным полотенцем или салфеткой;</li> <li>повторно обработать 70% этиловым спиртом или спиртосодержащим антисептиком с соблюдением экспозиции.</li> </ul>

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-2/1.12	Редакция	001	Страница	
Название	ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИЯМИ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ							2 из 4	
	<p>д) В случае <b>порезов и уколов кожи рук</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Немедленно снять перчатки, поместить их в емкость для сбора отходов класса Б,</li> <li>• Если кровь идет – не останавливать,</li> <li>• Вымыть руки проточной водой с мылом,</li> <li>• Обработать ранку 70% этиловым спиртом или спиртосодержащим антисептиком,</li> <li>• Смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода</li> <li>• Заклеить место повреждения пластырем.</li> </ul>								
	<p>ж) При попадании биологической жидкости на <b>униформу</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• санитарную одежду необходимо снять, сворачивая грязной стороной внутрь,</li> <li>• обработать дез.средством в концентрации, предусмотренной для работы с гемоконтактными инфекциями,</li> <li>• кожу под санитарной одеждой обработать согласно пункта 4.1г (см. выше),</li> <li>• униформу сдать в стирку.</li> </ul>								
5.	Сообщить об аварии вышестоящему по должности.								
6.	Сделать запись в «Журнале регистрации аварийных ситуаций».								
7.	Старшая медсестра Центра должна отправить Отчет об инциденте (заполняется онлайн) на позднее 24 часов после происшествия.								
10.	<p><b>Постконтактная профилактика:</b>  В первые 24 часа после контакта, но не позднее 72 часов пострадавший должен обратиться в ОГЦ СПИД для определения необходимости в постконтактной профилактике.  Постконтактная профилактика подразумевает прием антиретровирусных препаратов, применяющихся при лечении ВИЧ-инфекции.  Эти препараты назначаются только специалистами ОГЦ СПИД.</p>								
11.	Лица, пострадавшие в результате аварийной ситуации при выполнении служебных обязанностей (при медицинских манипуляциях), проходят медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции в момент обращения в ОГЦ СПИД и дальнейшее обследование через 1 и 3 месяца.								

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-2/1.12	Редакция	001	Страница	
Название	ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИЯМИ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ							3 из 4	

**Составлено на основании:**


1. СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", утверждены Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан №127 от 24 февраля 2015 года,
2. СП «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно - противозидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний», утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 марта 2015 года № 194,
3. Методические рекомендации «Профилактика ВИЧ-инфекции в рамках первичной медико-санитарной помощи», утверждены решением Экспертного Совета Республиканского Центра развития здравоохранения № 4 от 10.06.2014 г.

**Связанные документы:**

№	тип	название
КАЧ-А3	Руководство	Управление медицинскими инцидентами
КАЧ-А3/1	Алгоритм	Правила сбора и анализа отчетов об инциденте/несчастном случае
КАЧ-А3/1-а	Форма	Отчет об инциденте
МЕД-Д2	Руководство	Стандартные меры инфекционной безопасности.
МЕД-Д2/1.0	Алгоритм	Стандартные меры инфекционной безопасности.
МЕД-Д2/1.2	Алгоритм	Гигиеническая обработка рук.
МЕД-Д2/1.3	Алгоритм	6-ступенчатая методика гигиенической обработки рук.
МЕД-Д2/1.7	Алгоритм	Последовательность безопасного надевания и снятия СИЗ.
МЕД-Д2/1.12-а	Форма	Журнал регистрации аварийных ситуаций
МЕД-К3	Руководство	Оборудование, ЛС и ИМН для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
МЕД-К3/1	Алгоритм	Аптечка для оказания первой помощи (в том числе при шоках)

**Список изменений:**

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	17.04.2017	17	Алгоритм МЕД-Д2/1.12-001 «Экстренная профилактика профессионального заражения медицинских работников инфекциями с парентеральным путем передачи» введен впервые.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-2/1.12	Редакция	001	Страница	
Название	ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИЯМИ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ							4 из 4	

### Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				