




Тип документа	АЛГОРИТМ					Страница 1 из 3
Назначение	Медицинский персонал Представительств ТОО «B.B.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.8	Редакция	001	
Название	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК					
Разработано	Директор по операционно-клинической деятельности		Кондратьева О.О.			
Согласовано	Медицинский директор		Аубакиров М.Е.			
Подписано	Генеральный директор		Эргезер М.Ф.			
Утверждено	Приказом Генерального директора ТОО «B.B.NURA» № 17 от 17.04.2017 г.					
К внедрению с	24.04.2017 г.					

### Цель:

- Обеспечить использование стандартных мер предосторожности в целях снижения риска распространения микроорганизмов от известных и потенциальных источников инфекции, профессионального заражения и инфицирования пациентов,
- Внедрить методику безопасного выполнения работ с минимальным риском инфицирования и повреждения.

№	Положения	
1.	<b>Ношение перчаток не должно быть заменой гигиенической обработке рук.</b>	
2.	<b>Повторное использование перчаток после деконтаминации запрещено.</b>	
3.	Медицинские перчатки используются в двух основных целях: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снизить риск загрязнения рук медицинского персонала кровью и другими биологическими жидкостями;</li> <li>• Снизить риск контаминации объектов внешней среды потенциально патогенными микроорганизмами и передачу их от медицинского персонала к пациенту и обратно, а также от одного пациента к другому.</li> </ul>	
4.	Перчатки должны быть надеты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• перед асептической манипуляцией,</li> <li>• если предстоит контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, включая контакт с поврежденной кожей и слизистыми оболочками (независимо от необходимости соблюдать асептичность),</li> <li>• при контакте с пациентом (и с объектами внешней среды в его непосредственном окружении), если этого требуют контактные меры предосторожности.</li> </ul>
5.	Перчатки должны быть сняты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• сразу после того, как перчатки повреждены (или заподозрено нарушение их целостности);</li> <li>• после того, как контакт с кровью, другими биологическими жидкостями или с поврежденной кожей и слизистыми оболочками завершен;</li> <li>• после того, как завершен контакт с одним пациентом или с контаминированными участками тела, или объектами внешней среды в окружении пациента,</li> <li>• если есть показания для проведения гигиены рук.</li> </ul>
6.	<b>Использование перчаток и необходимые меры соблюдения гигиены рук:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если показание для проведения гигиены рук предшествует контакту, который требует также использования перчаток, необходимо провести гигиену рук (обработка антисептиком или мытье с мылом) до надевания перчаток,</li> <li>• если показание для проведения гигиены рук следует после контакта, требующего надевания перчаток, необходимо провести гигиену рук (обработка антисептиком или мытье с мылом) после снятия перчаток;</li> <li>• если показание для проведения гигиены рук появляется в то время, когда руки медицинского работника уже в перчатках, перчатки следует снять и провести гигиеническую антисептику рук или вымыть их с мылом.</li> </ul>	

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.8	Редакция	001	Страница	2 из 3	
Название	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК									

7.	<p><b>Ненадлежащее использование перчаток:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>использование перчаток при отсутствии показаний, является ненужной тратой материальных ресурсов и не способствует снижению степени перекрестной передачи потенциально патогенных микроорганизмов;</li> <li>это может также привести к тому, что будут пропущены те случаи, когда необходимо провести гигиену рук;</li> <li>использование контаминированных перчаток, которое связано с их неправильным хранением, неправильными показаниями для использования и техники надевания и снятия перчаток, тоже может стать причиной передачи потенциально патогенных микроорганизмов.</li> </ul>
8.	Рекомендуется выбирать перчатки без талька - это позволяет избежать кожных реакций у персонала, поскольку остатки талька на руках могут реагировать со спиртосодержащими антисептиками.
9.	Применение лосьонов или кремов для рук на вазелиновой основе может неблагоприятно отразиться на целостности латексных перчаток.
10.	<p>Безопасное использование перчаток предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>применение правильной техники надевания перчаток, которая предотвращает их контаминацию;</li> <li>применение правильной техники снятия перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников.</li> </ul>
11.	В случае нарушения целостности перчатки контаминированным объектом, ее следует снять, используя безопасную методику снятия перчаток, и провести обработку кожи согласно Алгоритму ТОО «B.B.NURA» «Экстренная профилактика профессионального заражения медицинских работников инфекциями с парентеральным путем передачи».
12.	В случае нарушения целостности перчатки неконтаминированным объектом, перчатки также необходимо снять и выполнить гигиеническую обработку рук перед повторным надеванием перчаток.

**Составлено на основании:**

- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", утверждены Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан №127 от 24.02.2015 года,
- «Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении: Резюме» (WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary), Всемирная организация здравоохранения, 2013 г,
- Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения (WHO) <http://www.who.int/patientsafety/ru/>.

**Связанные документы:**

№	тип	название
МЕД-Д2	Руководство	Стандартные меры инфекционной безопасности.
МЕД-Д2/1.0	Алгоритм	Стандартные меры инфекционной безопасности.
МЕД-Д2/1.2	Алгоритм	Гигиеническая обработка рук.
МЕД-Д2/1.3	Алгоритм	6-ступенчатая методика гигиенической обработки рук.
МЕД-Д2/1.4	Алгоритм	Хирургическое мытье рук.
МЕД-Д2/1.5	Алгоритм	Хирургическая антисептика рук.
МЕД-Д2/1.6	Алгоритм	Униформа и средства индивидуальной защиты.
МЕД-Д2/1.7	Алгоритм	Последовательность безопасного надевания и снятия СИЗ.
МЕД-Д2/1.9	Алгоритм	Методика безопасного надевания и снятия перчаток (нестерильных и стерильных)
МЕД-Д2/1.10	Алгоритм	Экстренная профилактика профессионального заражения медицинских работников инфекциями с парентеральным путем передачи

**Список изменений:**

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	17.04.2017	17	Алгоритм МЕД-Д2/1.8-001 «Использование перчаток» введен впервые.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.8	Редакция	001	Страница 3 из 3	
Название	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК								

### Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				