



Тип документа	СТАНДАРТ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР					Страница 1 из 3
Назначение	Все медицинские центры и отделения ТОО «В.В.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-КЗ/18	Редакция	002	
Название	ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ					
Разработано	Куратор региона		Отыншиев Б.Н.			
Согласовано	Руководитель отдела амбулаторного диализа		Стародубов А.Ю.			
	Медицинский директор		Канафина Ш.М.			
Утверждено	Приказом Исполнительного директора ТОО «В.В.NURA» № 56 от 15.07.2019 г.					
К внедрению с	01.08.2019 год.					

**Цель мероприятий оказания неотложной помощи при бронхоастматическом статусе:**

- 1) быстрое купирование судорог введением седативных средств;
- 2) поддержание и мониторинг жизненно важных функций организма.

**Основные и дополнительные диагностические мероприятия:**

- 1) оценка состояние сознания (состояние оглушенности, потеря сознания);
- 2) осмотр кожных покровов (бледные, иногда с цианотичным оттенком), видимых слизистых оболочек на предмет наличия эритемы, сыпи, отека, симптомов ринита, конъюнктивита);
- 3) определение наличия затрудненного глотания и дыхания;
- 4) оценка пульса (нитевидный), измерение частоты сердечных сокращений (тахикардия), артериального давления;
- 5) установление наличия таких симптомов, как рвота, непроизвольная дефекация и/или мочеиспускание.

**Алгоритм действий:**


- 1) уложить больного в положение на твердую поверхность в горизонтальном положении;
- 2) повернуть его голову набок, выдвинуть нижнюю челюсть для предупреждения западения языка, асфиксии и предотвращения аспирации рвотными массами;
- 3) обеспечить поступление свежего воздуха или проводить оксигенотерапию;
- 4) внутривенно вводится реланиум (диазепам) 2,0 мл; при необходимости сульфат магния 25%- 10,0 мл внутривенно;
- 5) при рвоте метаклопрамид (церуллин) 2,0 мл внутривенно;
- 6) мониторинг АД, ЧСС, ЧД.

**Перечень основных медикаментов:**

1. Реланиум (диазепам) 2,0 мл, амп.;
2. Сульфат магния 25%- 5,0 мл, амп.;
3. Натрия хлорид 0,9% - 5,0 мл, амп.;
4. Метаклопрамид (церуллин) 2,0 мл, амп.

**Перечень медицинского оборудования и расходных материалов:**

- 1) шприцы 2.0 мл.;
- 2) шприцы 5.0 мл.;

Тип	СОП	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-КЗ/18	Редакция	002	Страница 2 из 3	
Название	<b>ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ</b>								


- 3) шприцы 10.0 мл.;
- 4) перчатки стерильные;
- 5) шарики стерильные;
- 6) катетер для катетеризации периферических вен;
- 7) носовые катетеры для подачи кислорода;
- 8) мешок «Амбу» с лицевыми масками;
- 9) языкодержатель;
- 10) роторасширитель;
- 11) флуометр;
- 12) кислород 5-10 м3.

#### Составлено на основании:

Клинический протокол диагностики и лечения «Эпилептический статус у взрослых и детей» Рекомендованным Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от «29» ноября 2016 года протокол № 16

#### Список изменений:

№ ред.	Дата	№ приказа	Перечень изменений
001	30.12.2016	78	«Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме» введено впервые.
002	15.07.2019	56	«Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме» дополнены литературные данные, нумерации.

Тип	СОП	Код	БН-VIII/01	Номер	МЕД-КЗ/18	Редакция	002	Страница 3 из 3	
Название	<b>ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ</b>								

**Список ознакомления с документом**

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				